


Wat is primair hyperaldosteronisme?

Bij een primair hyperaldosteronisme wordt er in één van de bijnieren of in beide bijnieren te veel van het hormoon aldosteron aangemaakt.

Er zijn drie vormen van primair hyperaldosteronisme




Wat zijn de gevolgen van primair hyperaldosteronisme?




1

Hoge bloeddruk.



2

Zwakte.




3

Spiërkrampen.





4

Moeheid, gebrek aan energie.



5

Hoofdpijn.




6

Hartkloppingen.



7

Veel plassen, ook 's nachts.




8

Geheugen, concentratie en aandachtproblemen.




9

Soms laag kaliumzout in het bloed.



10

Soms verminderde nierfunctie.



11

Soms problemen met hart en bloedvaten.

Hoe wordt primair hyperaldosteronisme vastgesteld?

Klachten

- ▶ Hoge bloeddruk
- ▶ Hoofdpijn
- ▶ Laag kaliumgehalte
- ▶ Spierklachten
- ▶ Moeheid

[ZIE GEVOLGEN VAN](#)

[PRIMAIR](#)

[HYPERALDOSTERONISME](#)

Huisarts

Geen primair hyperaldosteronisme.

Mogelijk primair hyperaldosteronisme

Polikliniek ziekenhuis

- 1 Intake gesprek.
 - ▶ *beloop klachten*
 - ▶ *medicatiegebruik*
- 2
 - ▶ *lichamelijk onderzoek*

Mogelijke testen voor het aantonen van hyperaldosteronisme.

- ▶ *aldosteron, renine (bloedonderzoek)*
- ▶ *zoutbelastingstest*

- 3 Mogelijke testen nadat hyperaldosteronisme is aangetoond.

- ▶ *CT-scan bijnieren*
- ▶ *Bijniervene sampling*

Medisch specialist
(internist, endocrinoloog, vasculair geneeskundige)

1 2

Wanneer er geen primair hyperaldosteronisme is aangetoond, wordt gezocht naar andere oorzaak van de klachten. Bij geen bijzonderheden volgt terugverwijzing naar huisarts.

Er volgt verder onderzoek.

3

Testen positief

Oorzaak behandelen

Testen negatief

Primair hyperaldosteronisme is niet aangetoond.

Bij twijfel opnieuw testen.

Hoe wordt primair hyperaldosteronisme behandeld?

