


Wat is bijnierschorscarcinoom?

Bijnierschorscarcinoom is een kwaadaardig gezwel van de bijnieren, dat ingroeit in omringend gezond weefsel en dat de werking van het weefsel verstoort.

Per jaar wordt in Nederland bij ongeveer 17 mensen bijnierschorscarcinoom vastgesteld.
Dat komt neer op ongeveer 1 op een miljoen mensen.

Bijnierschorscarcinoom kan op alle leeftijden voorkomen maar openbaart zich meestal op een leeftijd van tussen de 40 en 70 jaar



Wat zijn de gevolgen van bijnierschorscarcinoom?

1


Klachten die worden veroorzaakt door de grootte van het gezwel of door ingroei en druk op andere weefsels



Pijn.



Misselijkheid en braken.



Kortademigheid.



Slechtere stoelgang.

2


Klachten die worden veroorzaakt door overproductie van hormonen

Cortisol


Klachten en verschijnselen van het syndroom van Cushing



Typische vetverdeling.



Striae.



Spierafbraak.



Moonface.




Hoge bloeddruk.



Dunne huid.
Blauwe plekken.




Moeheid.



Cognitieve en
stemmingsproblemen.

Aldosteron

Klachten en verschijnselen van primair hyperaldosteronisme




Spierkrampen.



Hoge bloeddruk.



Hoofdpijn.



Hartkloppingen.



Laag Kaliumgehalte.

Androgenen

Klachten en verschijnselen van hyperandrogenisme



Overbehaar.



Overmatig zweten.



Acne.



Menstruatie-
problemen.



Zwaardere stem.



Verminderde
vruchtbaarheid.

Hoe wordt bijnierschorscarcinoom vastgesteld?

Beoordeling huisarts of medisch specialist in verband met klachten en verschijnselen

Polikliniek ziekenhuis


Mogelijk bijnierschorscarcinoom

Internist (endocrinoloog)

Onderzoek bij een gezwel in de bijnier.

1

Aantonen of er sprake is van een kwaadaardig gezwel




- plaats, grootte, uitbreiding van het gezwel
- aanwezigheid van uitzaaiingen




- onderzoek van (een deel van) het gezwel door patholoog-anatoom

2

Aantonen of er sprake is van hormonale overproductie




- bloedonderzoek en urineonderzoek naar de overproductie van cortisol, androgenen, en aldosteron



Behandelen

* Diagnostiek vindt bij voorkeur plaats in een centrum van Bijniernetwerk Nederland (de 8 UMC's en het Maxima Medisch Centrum)

Hoe wordt bijnierschorscarcinoom behandeld?



Behandeling vindt bij voorkeur plaats in een centrum van Bijniernetwerk Nederland (de 8 UMC's en het Maxima Medisch Centrum)